



塩分のとりすぎに注意しましょう！

【秩父地域の高血圧の割合】

高血圧判定
■ 有意に高い
■ 高い
■ 低い
□ 有意に低い



秩父地域は、県内で、
男女とも「高血圧」の割合が高い地域です。

出典(引用)：埼玉県衛生研究所「令和3年度 埼玉県特定健診
データ解析【協会けんぽ十市町村国保】」

高血圧の原因は？

喫煙

肥満

運動不足

ストレス

塩分のとりすぎ

睡眠不足



血圧が高いことに、慣れていませんか？

血圧が高くなっても症状として現れず、気づきにくい。



高血圧は知らないうちに進行し『脳卒中』『心臓病』など急激な症状を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。また、塩分摂取が多いことが重なり、『腎硬化症』という合併症を発症する可能性もあります。

塩分をとりすぎると、血液量が増え心臓の負担になり、血圧が高くなります。

血圧が高い状態が続くと、血管に負担がかかります。



塩分をとりすぎることで『高血圧』『動脈硬化』『脳卒中』『心臓病』『慢性腎臓病(CKD)』等のリスクを高めることになります。

**※食品に含まれる塩分量を確認して、
塩分控えめを心がけましょう！**



食料品に含まれる塩分量を意識しましょう！

調味料などを使って料理する時（調味料の量：塩分量）



めんつゆ(4倍濃縮)	大さじ1	1.9g
白だし	100ml	10.2g
ほんだし	5g	1.0g
すし酢	小さじ1	0.4g
ポン酢	大さじ1	1.5g
和風ドレッシング	大さじ1	0.8g
焼き肉のたれ	大さじ1	1.0g



カレールウ	20g	2.2g
麻婆茄子の素	35g	1.6g
麻婆豆腐の素	30g	1.4g
回鍋肉の素	26g	1.3g
浅漬けの素	100ml	8.8g
キムチ鍋の素	180cc	7.0g
豆乳鍋キューブ	1個	3.1g

お総菜やお弁当などを食べる時（食料品の量：塩分量）



おにぎり(ツナマヨ)	1個	1.1g
肉まん	1個	0.9g
カレーパン	1個	0.9g
チキンカツサンド	2個	2.1g
テリヤキバーガー	1個	4.2g
フライドポテト(M)	1個	0.8g



生姜焼き弁当	1個	3.3g
にぎり寿司	12貫	3.5g
太巻き	8貫	4.1g
ミートソースパグティ	1食	4.5g
ナポリタン	1食	4.6g
ピザ(マルゲリータ)	1/8切	1.1g

冷凍食品・レトルト食品・おやつを食べる時（食料品の量：塩分量）



餃子(冷凍)	5個	1.7g
春巻き(冷凍)	1個	0.3g
唐揚げ(冷凍)	100g	1.3g
たこやき(冷凍)	5個	1.1g
カルボナーラ(冷凍)	1食	2.7g
エビグラタン(冷凍)	1個	1.8g
焼きおにぎり(冷凍)	1個	0.6g



炒飯(冷凍)	200g	1.7g
エビピラフ(冷凍)	225g	2.2g
カップラーメン	1食	5.1g
カップうどん	1食	4.6g
カレー(レトルト)	1袋	3.0g
オールドファッションドーナツ	1個	0.7g
ポテトチップス	60g	0.6g

※食品に含まれる塩分量は、調理方法や種類などにより変わります。

食品の『栄養成分表示』で、「塩分」をチェックしましょう

栄養成分表示（1食〇g当たり）			
エネルギー	〇〇kcal	炭水化物	〇〇g
たんぱく質	〇〇g	食塩相当量	〇〇g
脂質	〇〇g		

塩分の摂取量の目標量：男性7.5g/日未満、女性6.5g/日未満

出典：厚生労働省「日本人の食事摂取基準2020年版」

高血圧がある場合は 男女とも6g/日未満

出典：日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン2019」



作成「ちちぶ医療協議会」（事務局：秩父市 地域医療対策課 ☎22-2279）

秩父市 保健センター ☎22-0648

横瀬町 健康子育て課 ☎25-0110

皆野町 健康こども課 ☎62-1288

長瀬町 健康こども課 ☎66-3111

小鹿野町 保健課 ☎75-0135