

帯状疱疹ワクチンの主な副反応

乾燥弱毒生水痘ワクチン（生ワクチン）	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン（不活化ワクチン）
<p>注射部位の発赤（44.0%）・そう痒感（27.4%）・熱感（18.5%）・腫脹（17.0%）・疼痛（14.7%）・硬結（13.5%）</p> <p>発疹・倦怠感（1～5%未満）</p> <p>皮膚の紅斑・そう痒、関節痛、筋骨格痛、動悸、疼痛（1%未満）</p> <p>その他、まれに重大な副反応として、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎があらわれることがあります。</p>	<p>注射部位の疼痛（79.1%）・発赤（37.4%）、筋肉痛（36.9%）、疲労（34.6%）、頭痛（28.3%）、注射部位の腫脹（24.2%）、悪寒（21.4%）、発熱（16.7%）、悪心・嘔吐・下痢・腹痛などの胃腸症状（12.0%）</p> <p>注射部位のそう痒感、倦怠感、疼痛（1～10%未満）</p> <p>注射部位の硬結・熱感、浮動性めまい、鼻咽頭炎、気道感染、無力症、食欲減退（1%未満）</p> <p>その他、まれに重大な副反応として、アナフィラキシー反応を含む過敏症状があらわれることがあります。</p>

【参考】 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」添付文書(2024年6月改訂第3版)より

シングリックス筋注用添付文書(2023年6月改訂第2版、用法変更)より