

◎令和8年4月1日以降に1回目の接種をする場合

使用ワクチン：9価ワクチン（シルガード9）

効 果：ヒトパピローマウイルス6，11，16，18，31，33，45，52及び58型の感染に起因する肛門癌（扁平上皮癌）及びその前駆病変（肛門上皮内腫瘍1，2及び3）並びに男性での尖圭コンジローマを予防する効果があります。

接 種 回 数：2回又は3回（1回目の接種時の年齢により異なります。）

予 診 票：新しい予診票に差替えが必要です。4月1日以降に電子申請または保健センター窓口にて交付申込みをしてください。（詳細は別紙「予診票交付申込みについて」をご覧ください。）

注 意 事 項：現在検討中のため変更になる恐れがあります。

※1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合 2回接種が必要です。



1回目
(初回)

2回目
(初回から6か月後)

1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。
接種間隔が5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

※1回目の接種を15歳になってから受ける場合 3回接種が必要です。



1回目
(初回)

2回目
(初回から2か月後)

3回目
(初回から6か月後)

上記の方法でできない場合 1回目の注射から1月以上の間隔をおいて2回目の注射を行った後、
2回目の注射から3月以上の間隔をおいて3回目の注射

◎令和8年3月31日までに1回目の接種をする場合

使用ワクチン：4価ワクチン（ガーダシル）

効 果：ヒトパピローマウイルス6，11，16及び18型の感染に起因する肛門癌（扁平上皮癌）及びその前駆病変（肛門上皮内腫瘍1，2及び3）並びに男性での尖圭コンジローマを予防する効果があります。

接 種 回 数：3回

予 診 票：すでにお送りしているものをお使いください。

注 意 事 項：① 4価ワクチン（ガーダシル）は令和8年12月に販売終了が予定されておりますので、早めの接種をご検討ください。

② 4価ワクチン（ガーダシル）で接種を開始した **男子** は途中から9価ワクチン（シルガード9）へ変更する「交接種」はできません。



1回目
(初回)

2回目
(初回から2か月後)

3回目
(初回から6か月後)

上記の方法でできない場合 1回目の注射から1月以上の間隔をおいて2回目の注射を行った後、
2回目の注射から3月以上の間隔をおいて3回目の注射